



Lamium galeobdolon - vhodným stanovištěm je polostinné místo



Papaver orientale - okrasný druh máku, červenokvětý kultivar

Výsadba trvalek

Trvalky, jak již název napovídá, jsou rostliny, které rostou na daném stanovišti mnoho let. Jejich typickým znakem je částečná nebo úplná ztráta nadzemní části v období vegetačního klidu. Tento fakt musíme zohlednit při výběru stanoviště, protože přibližně na půl roku nám v kompozici vytvoří prázdné místo.

Při volbě konkrétního druhu trvalek vycházíme vždy ze stanovištních poměrů daného místa a nároků daného rostlinného druhu. Je třeba zohlednit vláhové a sluneční podmínky na daném stanovišti.

Při přípravě plochy pro výsadbu trvalek musíme počítat s tím, že trvalky špatně odolávají tlaku plevelů a ještě hůře se vytrvalé plevele z výsadby trvalek odstraňují. Před samotnou výsadbou je nutné z plochy plevelů důkladně odstranit. Pro tyto účely se jako nejvhodnější jeví postřik totálním herbicidem (Roundup, Touchdown,

....). Tento postřik můžeme po 14-21 dnech zopakovat, zvýšíme tak intenzitu účinku. Poté je vhodné do půdy zapravit hnojivo (nejlépe s postupným uvolňováním).

Po odstranění plevelů a vyhnojení pozemku přistoupíme k výsadbě. Spon rostlin volíme dle druhu, který vysazujeme. Informace o vhodném sponu vám poskytne v zahradním centru. Zde by vám měli poskytnout i informace o případných specifických nárocích dané rostliny.

Po výsadbě rostliny důkladně zalijeme. Následná závlivka během roku je vhodná, ale musí být přiměřená. Trendem současné doby je závlivku přeceňovat a tudíž i přehánět. Okrasné rostliny nejsou lekniny, které vyžadují růst ve vodě. Závlivku provádíme s rozumem, tj. v závislosti na klimatických podmínkách, raději méně často a větším objemem vody.

Červen je měsíc, kdy pomalu končí jaro uvolňuje místo nastupujícímu létu. S létem přichází vyšší teploty, srážky a hlavně bouřky. V průběhu tohoto měsíce se začíná sklízet první ovoce, zahrada je zaplavená množstvím květů trvalek a naplno si užíváme sekání trávníků. Nesmíme zapomenout na pravidelné přihnojení výsadby, máme možnost letního řezu ovocných dřevin a připomenout bychom neměli na průběžnou kontrolu zdravotního stavu všech dřevin na zahradě.

Kosení, závlivka, hnojení a chemická ochrana travnatých porostů



Travníky v zahradách spojují jednotlivé funkční prvky a dodávají zahradě celistvost a prostor. Travník nám umožňuje bezproblémový pohyb po zahradě, zajišťuje nám vhodnou odpočinkovou plochu a také jeho kvalita reprezentuje celou zahradu.

Kvalitní „anglický“ travník se neobejde bez kvalitní údržby. Ne nadarmo se říká, že anglický travník vznikne tak, že zasete travní semeno a potom ho 100 let pravidelně udržujete.

V první řadě je nutné pravidelné kosení. Bohužel v České republice je zakořeněné, že kvalitní sekačka je sekačka rotační, navíc prodáváči obvykle podceňují četnost broušení noží.

Používání tupých noží v sekačkách ale nedokáže zajistit kvalitní travník. U takto sekaných trávníků jsou vždy konce travních stébel roztrženy a snadno zaschnou. Díky přischlým konečkům se jeví travník jako nažloutlý.

Tento problém se dá vyřešit vcelku jednoduše, ale bohužel pracně. Rotační sekačku je nutné zhruba každé třetí použití důkladně nabrousit, nejlépe po každém sekání.

Nejvhodnějším typem sekačky na zahradní nízce střižené travníky je sekačka vřetenová. Mnozí ji znáte z dob minulých, kdy velká část lidí běžela po zahradě a tlačila mechanickou sekačku. Dnešní vřetenové sekačky mají výrazně snazší chod. Typ tohoto sekacího ústrojí má obrovskou výhodu v tom, že seká na principu střihání.

K sekání „anglických“ trávníků nejsou vhodné ostatní typy sekacích ústrojí, jako jsou sekačky bubnové, strunové či dokonce různé typy mulčovačů.

Z hlediska sekání je také vhodné zmínit četnost seči. Vycházíme přitom z pravidla, že výška useknuté hmoty by měla být třetinová oproti hmotě, která zůstává. V období maximálního růstu je tedy vhodné sekat trávu i 2x týdně, zato v období sucha či slabého růstu stačí kosení 1x za dva týdny. Pokud se tráva nechá přerůst, tak

spodní část lehce zažloutne a po posekání zůstane plocha nažloutlá.

Závlivka není pro travník nutná, ovšem v období sucha je travník bez vody suchý a nevzhledný. Po prvním dešti samozřejmě zezelená. Pokud ovšem chcete mít travník zelený po celou sezónu, je nutná pravidelná každodenní závlivka. Tu je možné provádět jednak ručně (zahradní hadicí nejlépe s překlopným postřikovačem), nebo pomocí automatického závlahového systému. Ten za Vás každý den travník zalije a protože zalévá v noci šetří vodu a tím i Vaše peníze.

Mnoho lidí zastává názor, že lepší je hnojit travník méně a díky menším přírůstkům i méně sekat. Tento názor je ovšem nesprávný. Díky podvýživě jsou trávy oslabené a v porostu mají menší konkurenční schopnost. Nejnáročnější z trav je jilek vytrvalý (silněji zastoupen v golfových směsích) a nejméně náročná je kostřava ovčí. Naopak mnohé plevele v trávniku jsou na výživu nenáročné a v nevhodném trávniku snadno získají převahu.

V měsíci červnu až červenci je vhodné naposledy travník přihnojit dusíkatým hnojivem. Při pozdějším termínu hnojení nestihne tráva do zimy vyzrát. Špatně vyzrálá tráva pak může v zimě vymrznout nebo v případě silnější sněhové pokrývky trpí sněžnou plísni. Jako vhodné hnojivo na letní přihnojení lze doporučit například ledek vápenatý, který obsahuje dusík ve formě dusičnanu. Jedná se o směs dusičnanu vápenatého s hydratovanou vodou a dusičnanu amonného, která je pro rostliny snadno přístupná. Tráva pocítí přihnojení během něko-



lika dní, obsah vápníku snižuje půdní kyselost a tím i redukuje výskyt mechu v trávniku.

Další pracovní operací je kontrola zapleveleného trávniku a případné odplevelení. Podle síly zaplevelení volíme metodu zásahu. Při slabém zaplevelení můžeme zvolit mechanické odstranění plevelů, v případě silného zaplevelení je nutné použít speciální selektivní herbicidy. Tyto chemické prostředky působí pouze na dvouděložné rostliny, tudíž jednoděložnou trávu nepostihnou. Postřik je vhodné provést dle přiloženého návodu a použít i doporučené ochranné pomůcky.

Letošní novinkou ve spektru selektivních travních herbicidů je postřik DICOTEX. Je účinný pro široké spektrum plevelů a po aplikaci je možné trávu kompostovat, což doposud žádný jiný herbicid neumožňoval.

„Poslední,, letošní přihnojení výsadby



Pro zdárný růst rostlin je nutný dostatečný přísun živin. Dostatek a správnou kombinaci živin zajistíme pravidelným hnojením.

Následně popsaný postup výživy se vztahuje pouze na rostliny v půdě, které přezimují ve venkovních podmínkách. Nevztahuje se například na rostliny v zimních zahradách a na balkonové rostliny.

S hnojením začínáme před začátkem vegetačního období (zpravidla v únoru až březnu) a končíme s dostatečným předstihem před zimou, aby rostliny stihly do

prvních mrazů dostatečně vyzrát a nehrizlo poškození pletiv mrazem. Proto je vhodné poslední hnojení dusíkatými hnojivy provést maximálně koncem června. Po tomto přihnojení rostliny naplno využijí dodaný dusík, v poklidu dokončí prodloužený růst a využijí dodaný draslík pro vyzrání pletiv.

Hnojení okrasných výsadby není v této době nejnutenější, pro tyto rostliny stačí zásobní hnojení provedené před vegetací. Dodatečné letní hnojení lze doporučit u výsadby, u kterých potřebujeme dosáhnout maximálních ročních přírůstků. Ale i zde platí, že hnojení dusíkem se nesmí přehnat, jinak rostliny špatně přezimují. K hnojení těchto výsadby lze použít jakákoli hnojiva, která neobsahují vysoký obsah dusíku (např. ledek vápenatý 15%, speciální hnojiva na dřeviny atd.). Na přihnojování kyselomilných rostlin (Rododendron, Erica, Calluna...) musíme používat speciální kyselá hnojiva, abychom neměnili kyselý pH. Jistá omezení platí i pro přihnojování náhylnějších rostlin (Acer palmatum – japonské javory, Araucaria, ...). Tyto rostliny v tomto období již nepřihnojujeme.

Při přihnojování ovocných dřevin musíme respektovat specifické nároky během tvorby plodů. V této době jsou zvýšené nároky na příjem draslíku, fosforu a stopových prvků, dusík není nejdůležitějším prvkem. Živiny je nejvhodnější dodávat jarní aplikací komplexního hnojiva (Cererit, ...) a nebo během roku postřikem na list (Kristalon, ...).

Novinky v sortimentu okenních truhlíků



Pěstování rostlin v pěšebních nádobách není pro rostliny přirozené a přináší mnoho komplikací. Rostliny jsou plně odkázané na péči člověka. Bez pravidelné péče trpí a nesplňují daný estetický účinek.

V první řadě je nejdůležitější dostatečné zásobování vodou. Vody nesmí být nedostatek, ale také jí nesmí být

nadbytek. Dalšími důležitými faktory je výživa, oslunění, vhodný substrát a další.


Z hlediska zásobování vodou jsou na trhu dostupné různé typy samozavlažovacích truhlíků. Tyto truhlíky obsahují ve své spodní části zásobu vody, ze které je rostlina během vegetace odčerpává. Voda se po spotřebování doplní a vše se opakuje.

V letošním roce se na trhu objevila novinka od výrobce květináčů Lechuza. Jedná se o okenní truhlíky BALCONERA v délce 50 a 80 cm. Tyto typy truhlíků obsahují stejně jako celá kolekce ostatních nádob speciální dělicí přepážku, zalévací šachtu a vodoměr. Samozřejmostí je velký objem substrátu a vody (18l zeminy, 5l vody – Balconera 80). Právě velká zásoba vody a snadný způsob kontroly a doplňování je předností těchto truhlíků.

Jako u všech ostatních výrobků je zaručen moderní vzhled (nádobu je na pohled celistvá, bez podmysky – vše je uschováno uvnitř), UV stabilizace, mrazuodolnost a velmi kvalitní provedení.

Nádoby jsou k dispozici ve třech barevných verzích – bílá, hnědá a antracitová.

Představení rostlin




Akebia quinata 'Variegata' - akébie pětičetná

Rostlina pochází z Japonska. Dorůstá výšky až 12m, ale konkrétní výška závisí na výšce podpory, po které se ovívá. Na zimu částečně opadá. Nejvýraznější jsou na rostlině květy. Kvete v hroznech světle fialovými květy (samčí), hnědočervenými (samičí) v období IV-V.




Sequoiadendron gig. 'Pendulum' – sekvojovec obrovský

Sekvojovce jsou stálezelené a velmi dlouhověké stromy s mohutným kmenem. Tento kultivar je ale přesným opakem. Jedná se o kultivar, který má sloupovitý habitus a šířka málo kdy přesáhne 100cm.



Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' – bez hroznatý

Žlutě zbarvený kultivar bezu hroznatého je vyšlechtěn z obyčejného bezu. Od něj rostlina zdědila odolnost a nenáročnost na pěstební prostředí. Dorůstá výšky mezi 200 a 300 centimetry. Listy jsou zelenožluté, při rašení bronzové. Tato odrůda kvete žídká. Z důvodu větší hustoty keře je vhodné ho jednou za pár let seříznout.



Corylus avellana 'Red Majestic' ® - líska obecná

Rostliny Corylus avellana 'Contorta' a Corylus maxima 'Purpurea'. Líska dorůstá výšky cca 150 cm. Je typická silně pokroucenými větvíčkami jako u kroucené lísky. Od druhého rodiče získala červené listy, které mají ke konci vegetace tendenci barvit se do zelená.

Martin Hraňo, odborné služby zahradnické,
Žehušice, tel /fax: 327 399 161, www.hrano.cz