

SRPEN v zahradě

Během srpna se na zahradě můžeme setkat s bohatě kvetoucími teplomilnými druhy květin a v omezené míře s kvetením dřevin. Z dřevin kvetou například komule (Buddleia), ořechokřídlec (Caryopteris) a ojedinelé se vyskytují remontující květy na mochnách (Potentilla), tavolnicích (Spiraea) a jiných. Z důvodu vysokých teplot musíme věnovat zvláštní péči trávníku. V ovocné a zeleninové zahrádce pokračuje období sklizně. Občas se už koncem srpna mohou vyskytovat přezimní mrazíky, proto je nutné hlídat letněné pokojové rostliny.

Letní řez peckovin

Ovocné dřeviny je vhodné upravovat pravidelným řezem. Pokud budeme řezat peckoviny (broskve, meruňky, slivoně, třešně a višně), tak nejvhodnějším termínem je doba vegetace, u teplomilných rostlin (broskve, meruňky) koncem července, u ostatních během července až srpna. Letní řez peckovin omezuje bujný růst a podporuje tvorbu květních pupenů, což zabezpečí následnou kvalitní sklizeň. Vyloučením zimního řezu omezujeme výskyt klejotokové rakoviny a dalších chorob, zejména u broskví, meruněk a třešní.

Letním řezem odstraňujeme zahušťující obrost terčních větví – jednoleté výhony, tzv. vlky. Tento obrost stíní v koruně a zvyšuje za tepleho počasí vlhkost. Ve vlhku se lépe šíří plísňové choroby i škůdci.

Další výhodou letního řezu je možnost využít ho ke zjednodušení sklizně. Pokud se termín sklizně shoduje s termínem řezu, tak větve, které chceme odstraňovat, řežeme i s plody a vlastní sklizeň probíhá na zemi.



Peckovina - višně

Z hlediska techniky řezu je vhodné při sesazování větších větví řezat tzv. na dvakrát. To znamená, že první řez provedeme zhruba 30 cm nad druhým, finálním řezem. Tímto postupem zabráníme nechtěnému zatrhnutí kůry vlivem pádu těžké větve.

Ošetřování balkonových rostlin



Balkonový truhlík BALCONERO 80 osazený plnokvětou surfinií glechomou a plectranthusem

Minimálně jednou týdně je nutné rostliny přihnojovat. Využíváme specializovanou hnojiva na balkonové rostliny, dávkování řídíme dle informací v příbalovém letáku. Omezené množství půdy v nádobě není schopno pokrýt nároky rostlin na živiny a proto je nutné živiny dodávat.

Pravidelně také kontrolujeme výskyt chorob a škůdců. Pokud zaznamenáme jen nepatrný výskyt, okamžitě se pustíme do boje s těmito neinvazivními hosty, protože sebe-méně zaváhání může mít fatální následky. Pokud si nejste výskytem případné choroby či škůdce jisti, odeberte vzorek z poškozené rostliny a v zahradnictví vám již pomohou určit, o č se jedná a poskytnou vám i radu ohledně účinného boje a případné prevence.

Pokud chceme mít truhlíky se záplavou květů, je nutné rostliny pravidelně ošetřovat. Odstraňujeme odkvetlé květy, rostliny se tolik nevysilují a mohou napnout veškeré úsilí k tvorbě nových květů. Odstraňujeme žloutnoucí části rostlin, zabraňujeme tak případnému zahánění či plisni, odstraňujeme suché listy a části rostlin, naložené části, případně rostliny citlivě zakrátkujeme. Při zálivce se snažíme co nejméně smáčet listovou plochu. Bujná vegetace hůře vysychá a vlhké prostředí je živnou půdou pro různé plísně.

Při pravidelném ošetřování se vám rostliny odmění záplavou květů, kterých si můžete užívat až do časného podzimu.

Nyní, uprostřed léta, nám vracejí naši péči nádoby osazené letničkami a poskytují doslova pastvu pro oči nepřebernou škálou barev a květů. Jak o ně pečovat, aby nás svou nádherou těšily co nejdéle?

Prvořadá je vydatná zálivka. V tropických letních dnech je bezpodmínečně nutné zajistit rostlinám dostatečný přísun vody. Ideální jsou samozavlažovací truhlíky, které jsou schopny pojmout určité množství vody a rostlina s ní následně hospodáří. Při osazení obyčejných truhlíků, koryt nebo různých jiných nádob je nutné počítat s častější zálivkou, v horkých slunných dnech i několikrát denně.

Představení rostlin ...



Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'

Ořechokřídlec pochází z Číny a Japonska. Dorůstá do výšky cca 1m a jeho modré květy jsou medonosné. Kvetoucí vrcholíky jsou na letorostech a objevují se koncem srpna. Jelikož kvete pouze na letorostech, je vhodné každoročně koncem zimy provést sestřížení na cca 20 cm. Na půdu je rostlina nenáročná, ovšem hůře snáší nadměru vody.



Buddleia davidii

Komule davidova, lidově letní šerík nebo také motýlí rostlina je keř, dorůstající do výšky 2 - 3 m. Rostlina je na půdu nenáročná, ale během zimního období hůře snáší nadměru vody. V nepříznivých zimních podmínkách má tendenci k vyhnívání. Kvete koncem srpna v hustých latách. Květy jsou velmi lákavé pro motýly, a proto je keř během kvetení obalen hejny motýlů.



Cortaderia selloana

Pampová tráva je vytrvalá rostlina, která pochází z Jižní Ameriky. Při pěstování v našich podmínkách vyžaduje zimní kryt. Tato ochrana musí zabránit nadměře vlhkosti a tím vyhnout rostlinu. Vyžaduje teplé a propustné půdy s dostatkem živin. Dorůstá do výšky cca 1,5 m a v době květu je ale vyšší. Barva květů je v odstínech od bílé až po růžovou. Před příchodem zimy je vhodné listy svázat do snopu. Seřiznutí starých listů provedeme na jaře na cca 20 cm.

Zvláštní péče o trávník v období léta



Zavlažovaný trávník výše sečený v období sucha

V období letních měsíců je vhodné poupravit systém péče o travnaté porosty. V tomto období je vyšší výskyt tropických dnů a s tím spojené podprůměrné srážky. Takže pokud nemáme nainstalovanou automatickou závlahu nebo pokud denně nezaléváme, musíme změnit četnost seči.

Dojde-li navíc k posečení příliš nízkou a budou následovat tropické teploty, bude plocha daleko snadněji vysychat a trávník bude trpět suchem. Pokud ovšem sekačku nastavíme na vyšší výšku a tím pádem ponecháme více zelené hmoty, trávník bude z této hmoty čerpat zásobní vodu a lépe přečká období sucha. Takto výše sečený porost je zelenější a vypadá lépe než nízkou posekaný zažloutlý trávník.



Nesečený trávník v období sucha

Bylinky trochu jinak

Šalvěj, máta, tymián, oregano, saturejka, bazalka, petržel, pažitka, meduňka. Všichni je velmi dobře známe, žádná kuchyně se bez nich neobejde. Mnozí z nás si je pěstují buď na zahrádce, nebo v květináčích. Kouzlo zelených bylinek oceníme zvláště při úpravách masa na gril, do čerstvých zeleninových salátů, do omáček, zkrátka při každodenním vaření. Tyto bylinky se však dají využít i jinak. Málokdo zná jejich léčivé účinky. Proto neváhejte, přebytek bylinek usušte, dobře uskladněte nejlépe v látkových pytlíčkách a na zimu máte o zdraví postaráno.



Mátu peprnou

(Mentha piperita) využijeme při všech druzích žaludečních potíží. Máta tlumí nadýmání a křečovitě bolesti v trávicím ústrojí. Zlepšuje trávení, příznivě ovlivňuje funkci žlučníku. Zevně lze využít jako kloktadlo k dezinfekci dutiny ústní.

Meduňka (Melissa officinalis) používáme při žaludeční a střevní neuróze jako prostředek povzbuzující chuť k jídlu, při bušení srdce a arytmií nervového původu. Má mírně sedativní účinky a je vhodná ke zklidnění organismu při poruchách spánku. Protizánětlivý účinek lze využít proti ztvrdnutí mateřského mléka v mléčných žlázách.

Bazalka (Ocimum basilicum) podporuje žaludeční činnost, zvyšuje sekreci žaludečních šťáv, snižuje nadýmání a podporuje chuť k jídlu. Má mírně sedativní účinky, je tedy vhodná při nespavosti. Zevně ji lze použít stejně jako mátu k dezinfekci dutiny ústní při paradentóze a také k obkladům na opruzeniny.

Sušené květy

Sušit nemusíme jen rostliny určené k potravinářským nebo léčebným účelům. Sušit můžeme i rostliny z čistě estetického hlediska. Takto lze využít celou řadu rostlin, musíme se jen pořádně rozhlédnout kolem sebe.

Každá rostlina se sbírá v jiném stádiu zralosti. Mezi rostliny sklizené ve stádiu rozkvětání či květních poupat patří např. smil listnatý (Helichrysum), lidově slaměnka. Při sušení poupat totiž postupně dokvétá. Dále sem patří růže (Rosa), pivoňky (Paeonium) a zlatobýl (Solidago).

Nejčastěji se sklízí rostliny v plném květu, kdy je rozkvetlá více než třetina květů. Do této skupiny patří smilky (Helipterum), světlíce barvířská (Carthamus), řebríček (Achillea), statice (Goniolimon) nebo ostrožka stračka (Consolida regalis).



Pennisetum japonicum - tráva k sušení

Rostliny sbírané po odkvětu jsou okrasné plodem nebo souplodím, nebo jim po odkvětu zůstávají zajímavé kalichy, např. širokalkalich hládký (Moluccella). Rostliny okrasné plodem sklízíme, když je plod plně vyvinutý a typicky vybarvený. Je to



Achillea filipendulina řebríček - k sušení

např. černucha (Nigella), len (Linum), měsíčnice (Luna-ria), tykve (Cucurbita) aj.

Rostliny okrasné listem sbíráme v době plně vyvinutých, vyzrálých a typicky vybarvených lodyh a listů. Jsou to zejména čistic (Stachys), starček (Senecio), šalvěj (Salvia) a další.

Rostliny sušíme nejčastěji přirozeným teplem v tmavých a dobře větratelných místnostech. V ideálních podmínkách jsou rostliny zcela suché za 5 - 10 dní. Při sušení nevystavujeme rostliny světlu, ztrácí pak barvu nebo naopak hnědnou. Rostliny sušíme zavěšené ve svazcích, tak, aby mezi jednotlivými svazky mohl volně cirkulovat vzduch.

Ing. DiS. Martin Hraňo, Ing. Gabriela Rychnovská, odborné služby zahradnické,
Žehušice, tel /fax: 327 399 161, www.hrano.cz